

Dr. Santos Flor
Sept 1862.

Monographie
der
Spinnen
von
Dr. Carl Wilhelm Hahn

Nürnberg 1820.

Monographia
Araneorum
a
Dr. Carolo Guilielmo Hahn

Norimbergia, MDCCCXX.

Sr. Hohehrwürden und Hochgeboren

dem Herrn

Franz von Paula von Schrank

Ritter der baierischen Krone,

Königlich Baierischen geistlichen Rathe, Director des botanischen Gartens zu München, der Königlich Baierischen Akademie der Wissenschaften, wirkliches, und vieler anderer Akademien und gelehrten Gesellschaften, wirkliches und Ehrenmitglied etc. etc. etc.

widmet

dieses Werk

als einen geringen Beweis

der innigsten Hochachtung und Verehrung

der

Verfasser.

Vormerkung.

Seit mehreren Jahren füllte ich meine arbeitsfreyen Stunden mit dem Studium der Insecktenkunde aus, und vorzüglich zogen die Spinnen meine besondere Aufmerksamkeit auf sich, daher sammelte und beobachtete ich alle mir vorgekommenen Arten. Anfangs setzte ich alle in Weingeist, da mir eine bessere Art, sie aufzubewahren, nicht bekannt war, (und dieß scheint auch die Ursache zu seyn, warum diese Klasse so stiefmütterlich behandelt wurde). Als ich aber meine, bereits in dem Inseckten-Katalog des Herrn Sturms dahier vom Jahre 1817 bekannt gemachte Methode, solche an Nadeln gesteckt auszutrocknen, erfand, wurde meine Vorliebe zu dieser Inseckten-Klasse so groß, daß ich weder Mühe noch Zeit sparte, alle in hiesiger Gegend vorkommenden Arten zusammen zu bringen, welches mir auch so ziemlich geglückt seyn wird, denn ich kenne bereits 160 Arten aus Franken und Baiern, worunter ein Sechstheil ganz neu ist.

Praefatio.

Ex longo tempore horas negotiis vacuas explebam insectorum notitia, ac praecipue araneae singularem apud me creabant attentionem: itaque ordines mihi oblatos omnes collegi atque observavi. Primo omnes in spiritu vini posui, quum essem modi melioris ignarus, earum servandarum (quod etiam videtur causa fuisse, cur is ordo huc usque adeo segniter tractaretur). Cum autem rationem meam jam in Sturmii domini insectorum catalogo, anno MDCCCXVII declaratam, has ad acum affixas exsiccandi, invenissem, tantum hujus ordinis fiebat studium promptius, ut nec operae nec tempori parcerem, species, quae inveniri poterant, indigenas omnes colligendi, quod mihi quoque ferme contigerit. Jam enim novi species 160 ex Franconia atque ex Bavaria, quorum sexta pars est satis nova.

Ausländische Arten verdanke ich der Güte meiner Freunde, welche mir mehrere schenkten; und mit Bereitwilligkeit erhielt ich die Erlaubniß, die in mehreren privat und öffentlichen Sammlungen sich befindlichen, von mir nicht besitzenden, Arten zu vergleichen, abzubilden und zu beschreiben.

Man kennt außer Walkenaers hist. nat. des araneïdes, Paris, 1806, wovon aber nur 4 Lieferungen erschienen sind, kein Werk neuerer Zeit, welches die Spinnen ausschliessend zum Gegenstand hätte, und dieses Werk scheint nicht mehr fortgesetzt zu werden. Naturgetreue Abbildungen sind nur wenige vorhanden, und die Schwierigkeit, oder gar Unmöglichkeit die Arten nach den kurzen Beschreibungen richtig zu bestimmen, ist allgemein bekannt.

Aus diesen Gründen wage ich es, den Freunden der Insectenkunde ein Werk in die Hände zu liefern, welches außer den genauen Beschreibungen auch getreue Abbildungen enthält, und vielleicht wenig mehr zu wünschen übrig lassen wird, und hinsichtlich der Abbildungen um so mehr, da mein Freund, Herr Sturm dahier die Korrektion derselben gütigst übernommen hat.

Die Abbildungen werden nur nach lebendigen, oder sehr gut conservirten Exemplaren gemacht.

Species exoticae habere, amicis meis debeo, qui eorum plura mihi donabant: animoque promptissimo, species, quae sunt in pluribus collectionibus et privatis et publicis, quaeque ego non possideo, comparandi, depingendi, describendique, accipi veniam.

Neque adeo praeter Walkenaers hist. nat. des Araneïdes, Paris, MDCCCVI, cujus quatuor tantum fasciculae in lucem proditae sunt, quisquam fuit recentiori tempore, qui accuratiori editioni materiem araneorum parare institueret, neque id opus continuari videtur. Icones ad naturam modo paucae sunt, ac difficile esse, vel fieri non posse, quin species pro descriptionibus brevibus recte determinentur, vulgo notum est.

Quibus causis ductus, Entomologiae amicis exhibere opus, audeo, quod praeter descriptiones quam accuratissimas, etiam ad naturam icones continet, ac fortasse nihil amplius erit in votis: quodque potius attinet ad icones, quum Sturmius dominus amicus meus, in urbe nostra habitans, earum correctionem benigne receperit.

Icones ad viva tantum vel exemplaria optime conservata conficiuntur.

Alle Monate wird eine Lieferung mit 4 Tafeln erscheinen, und dieser ein Blatt Text beygelegt werden, worauf nur kurz die Art-Kennzeichen und Vaterland angegeben wird. Nach Beendigung der Abbildungen wird der ausführliche Text nachgeliefert, und ein Register der Tafeln beygelegt, damit solche systematisch geordnet werden können, daher auch die Platten keine Nummern erhalten.

Walkenaers Tableau des Aranéïdes, Paris, 1805, habe ich als systematische Grundlage, nur mit einigen wenigen Abänderungen, angenommen, und setze für diejenigen, welche solches etwa nicht besitzen sollten, hier auszugsweise das Nöthige bey.

Singulis mensibus fascicula cum quatuor tabulis in lucem prodibit, hisque textus addetur, in quo paucis synonyma et patria significatur. Finitis iconibus textus copiosus postea exhibetur, atque index tabularum additur, istae ut ex ordine systematico componi possint, ergo tabulae etiam numeros non accipiunt.

Opera Walkenaer, quod inscribitur: Tableau des Aranéïdes, Paris, MDCCCV, principium systematicum feci parum mutatum, eisque, qui id non possideant, summatim addo necessaria.

A r a n e i d e s.

Tribus I. Theraphosa.

Gen. 1. Mygale. Walk. Latr.

Fam. 1. Plantigrades.

M. fasciata. Latr.

M. avicularia. Linn. Fabr,
etc. etc.

Fam. 2. Digitigrades inermes.

M. calpeiana. Walk. Latr.

Fam. 3. Cuniculariae.

M. cementaria. Walk. Latr.

M. Sauvagesii, Latr. Rossi. fodiens. Walk.
etc. etc.

Gen. 2. *Oletera*. Walk. *Atypus*. Latr.

O. picea Sulzer. *O. atypus* Walk. *A. Sulzeri*, Latr.

*Gen. 3. *Missulena*. Walk. *Eriodon*. Latr.

**M. occatoria*. Walk, ex Notasia.

Tribus II. *Aranea*.

Gen. 4. *Lycosa*. Latr. Walk.

Fam. 1. *Terricolae*.

L. tarantula. Linn. Fabr.

L. saccata. Linn. Fabr.

L. dorsalis. Fabr. *lugubris*. Walk.

etc. etc. etc.

Fam. 2. *Piraticae*.

L. piratica. Wnlk.

Fam. 3. *Caudatae*.

**L. albimana*. Walk.

Gen. 5. *Dolomedes*. Walk. Latr.

Fam. 1. *Ripuariae*.

D. marginatus. Panz.

D. fimbriatus. Linn. Fabr.

etc.

Fam. 2. *Sylvariae*.

D. mirabilis. Walk. Latr. *A. obscura*. Fabr.

*Gen. 6. *Ctenus*. Walk.

**C. dubius*. Walk. ex Cajennae.

Gen. 7. *Spasus*. Walk. *Oxyopes*. Latr.

S. heterophthalmus Walk. *O. variegatus* Latr.

S. lineatus Latr.

etc. etc.

Gen. 8. *Eresus*. Walk. Latr.

E. cinnaberinus. Walk. Latr. *A. 4-guttata* Rossi.

E. ater Walk. *A. nigra* Petagna.

Gen. 9. *Attus*. Walk. *Salticus*. Latr.

Fam. 1. *Saltatoriae*.

R. 1. *Abbreviatae*.

A. trilineatus. Fabr.

A. pubescens. Fabr.

A. Scenicus. Linn. Fabr.

etc. etc. etc.

R. 2. Elongatae.

A. Rumphii Scop. A. tardigradus Walk.

Fam. 2. Volatiliae.

A. formicarius. Degeer. Walk. Latr.

A. paralellus. Fabr.

etc. etc.

Fam. 5. Pigrae.

A. depressus. Walk.

Gen. 10. Thomisus. Walk. Latr. Heteropoda, Missumena. Latr.

Sect. 1. Heteropodae.

Fam. 1. Depressae.

R. 1.

*T. canceridus Walk. ex Notasia.

R. 2.

*T. palagusius. Walk. ex Notasia.

Fam. 2. Brevipedes.

R. 1. Rotudatae.

T. rotundatus. Walk. A. globosa Fabr. A. irregularis Panz.

R. 2. Pyriformes.

T. diana. Walk.

Fam. 3. Cancroides.

R. 1. Truncatae.

T. truncatus Walk. Pallas. A. horrida Fabr.

etc.

R. 2, Globosae.

T. citreus. Walk. Degeer.

T. litturatus. Fabr.

etc. etc. etc.

R. 3. Globosae oculatae.

T. cristatus. Walk. Latr.

R. 4. Bituberculatae.

*T. onustus. Walk. ex Gallia merid.

R. 5. Ovatae.

T. floricolens. Walk. A. dorsata. Fabr. Panz.

T. violaceus. Walk.

R. 6. Rugosae.

*T. rugosus. Walk. ex Insula Gallia.

Fam. 4. Oxyopes.

*T. melacostraceus. Walk. ex Notasia.

Fam. 5. Quadrangulariae.

T. pigrus. Walk.

T. bilineatus. Walk.

Sect. 2. Equipedes brevirostres.

Fam. 6. Cancroides longipedes.

T. tigrinus Walk. *A. laevipes*, Linn.? Fabr.?

Sect. 3. Equipedes longirostres.

Fam. 7. Ovilabrae.

T. aureolus. Walk. Clerk.

T. cespiticolens. Walk.

Fam. 8. Robustae.

R. 1.

**T. grapsus*. Walk. ex Natasia.

**T. pagurus*. Walk. ex Natasia.

R. 2.

T. leucosia. Walk. Latr. *A. regia*. Fabr.

**T. pinotheres*. Walk. ex Natasia.

Fam. 9. Filipes.

**T. dispar*. Walk. ex Gallia.

Fam. 10. Oblongae.

R. 1.

T. oblongus. Walk.

T. argentatus. Walk.

R. 2.

T. rhomboicus. Walk. *A. formicinus*. Clerk.

Gen. 11. Sparassus. Walk. Micrommatha. Latr.

Fam. 1. Micrommathae.

Sp. smaragdulus. Walk. Fabr.

Sp. ornatus. Walk.

etc. etc.

Fam. 2. Optices.

Sp. argelasius. Walk.

Sp. pallens. Walk.

Gen. 12. Clubiona. Latr. Walk.

Fam. 1. Dryades.

C. holosericea. Walk. Latr. Linn. Fabr.

C. corticales. Walk.

Fam. 2. Hamadryades.

C. accentuata. Walk.

Fam. 3. Nymphae.

C. nutrix. Walk. Latr.

C. aloma. Walk.

Fam. 4. Parcae.

C. atrox. Walk. Degeer.

**C. sacva* Walk. ex Notasia.

Fam. 5. Furiae.

C. lapidicolens. Walk.

Gen. 13. Drassus. Walk. Latr. Gnaphosa. Latr.

Fam. 1. Lithophilae.

D. lucifugus. Walk. melanogaster. Latr.

Fam. 2. Phytophilae absconditae.

D. nocturnus. Walk. Linn.

D. fulgens. Walk. *D. relucens.* Latr.

etc. etc.

Fam. 3. Phytophilae conspicuae.

D. viridissimus. Walk.

Gen. 14. Disdera. Latr. Walk.

D. erithrina. Latr. Walk. *A. Hombergii.* Scop.

Gen. 15. Segestria. Latr. Walk.

S. perfida. Walk. *cellaria* Latr. *A. florentina.* Rossi.

S. senoculata. Walk. Latr. Fabr. Linn.

Gen. 16. Aranea. Latr. Linn. Fabr. etc. Tegenaria Latr. Walk.

Agelena Walk.

Fam. 1. Vestariae.

A. demostica. Linn. Fabr. etc.

A. agrestis. Walk.

etc. etc.

Fam. 2. Labirinthiariae.

A. labyrinthica. Linn. Fabr.

**A. naevia.* Bosc. Walk. ex Carolina.

*Gen. 17. Nyssus. Walk.

**N. coloripes.* Walk. ex Notasia.

Gen. 18. Epeira. Walk. Latr.

Fam. 3. Elongatae cylindricae.

**E. chrysogaster* Walk. *A. pilipede.* Latr. ex India orient.

E. clavipes. Walk. Latr. Linn. Fabr.

etc. etc.

*

Fam. 2. Zona'ae.

- E. fesciata*. Walk. Latr. Fabr. *A. formosa*. Villers. *A. phragmitis*. Rossi. *A. Zebra*. Sulzer.
E. fastuosa. Walk. Oliv.
 etc. etc.

Fam. 3. Oculatae.

- E. latro*. Walk. Fabr.

Fam. 4. Encarpatae.

- E. mamata*. Walk. Degeer.
E. sericea. Walk. Latr. Oliv.
 etc.

Fam. 5. Triangulariae gibbosae.

- E. angulata*. Walk. Latr. Linn. Fabr.
E. gibbosa. Walk.
 etc. etc. etc.

Fam. 6. Ovatae maxillis brevibus, rotundatis.

R. 1. Ovatae triangulariae.

- E. diadema*. Linn. Fabr. Walk. Latr. etc.
E. millitragia. Walk.
 etc. etc.

R. 2. Ovatae triangulariae, latae.

- E. agalena*. Walk. Ar. notatus. Clerk.
E. triguttata. Walk. Fabr.

R. 3. Ovatae oviformes.

a.

- E. scalaris*. Fabr. Walk. Panz. Ar. *piramidatus*. Clerk.
A. Betulae. Sulzer.
E. dioida. Walk.
 etc. etc.

b.

- E. quadrata*. Linn. Fabr. Walk. *A. regalis*. Panz.
E. umbratica. Walk. Clerk. *A. ricatricosa*. Degeer.
 etc. etc. etc.

Fam. 7. Ovatae maxillis elongatis.

R. 1. Verticales.

- E. calophylla*. Walk. Latr.
E. tubulosa. Walk. Ar. *hamatus*. Clerk.

R. 2. Inclinatae.

- E. inclinata*. Walk. *A. reticulata*. Linn. *Ar. segmentatus*. Clerk.
E. fusca. Walk. Menardi. Latr.
 etc. etc. etc.

R. 3. Horizontalae.

- E. cucurbitina*. Linn. Fabr. Walk. Latr.
 **E. circulata*. Walk. ex Surinama.

Fam. 8. Irregulares.

R. 1. triquedrae.

- E. conica*. Walk. Latr. Pallas. *E. triquedra*. Sulzer.

R. 2. Mamellonae.

- E. oculata*. Walk.

Fam. 9. Spinosae.

R. 1. spinosae elongatae.

- E. aculeata*. Walk. Latr. Fabr.
E. spinosa. Walk. Fabr.
 etc. etc.

R. 2. Abbreviatae.

- E. cancriformis*. Walk. Fabr.
E. hexacantha. Walk. Fabr.

R. 3. Depressae.

- **E. clypeata*. Walk. ex —
 **E. scutiformis*. Walk. ex Insula Timor.

Fam. 10. Coronatae.

- E. sexcuspidata*. Walk. Fabr.

Gen. 19. Uloborus. Latr.

- U. Walkenaerius*. Latr.

Gen. 20. Tetragnata. Latr. Walk.

- T. extensa*. Walk. Latr. Linn. Fabr.
 **T. elongata* Walk. *Ar. gibba*. Bosc. ex Carolina.
 etc. etc.

Gen. 21. Linyphia. Latr. Walk.

- L. triangularis*. Latr. Walk. *A. Albinii*. Scop. *Ar. resupina*
sylvestris. Degeer.
L. montana. Walk. Linn. Fabr.

Gen. 22. Theridion. Walk. Latr. Theridion, Latroductus. Walk.
Scydotes. Latr.

Fam. 1. Ovatae.

T. lineatum, redimitum et ovatum. Walk etc. etc.

Fam. 2. Rotundatae.

T. 4—punctatum. Walk. Fabr. etc. A. bipunctata. Linn.

T. maculatum. Walk. A. albomaculata. Degeer.
etc. etc.

Fam. 3. Turgidae.

T. sysiphum. Walk. Latr.

T. dentieulatum. Walk.
etc. etc.

Fam. 4. Crypticolae.

T. erypticolens. Walk.

Fam. 5. Triangulilabrae.

T. triangulifer. Walk.

T. punctum. Walk.
etc. etc.

Fam. 6. Abscondatae.

T. obscurum. Walk.

T. signatum. Walk.

Fam. 7. Minimae.

T. benignum. Walk.

Fam. 8. Tuberculatae.

T. aplane. Walk.

Fam. 9. Longipedes.

*T. incertum. Walk. ex Natasia.

Fam. 10. Nodulariae.

R. 1. Globulosae.

T. 13—guttatus. Latr. Latroductus 13—guttatus. Walk. A.
13—guttata. Rossi.

R. 2. Ovatae elongatae.

T. mactans. Latroductus mactans Walk. A. mactans. Fabr. ex
America.

Gen. 23. Scydotes. Latr. Walk.

S. thoracica. Latr. Walk.

Gen. 24. *Pholcus*. Walk. Latr. *Scydotes* Latr.

P. phalangioides. Walk. Latr. *A. Pluchii*. Scop. *A. oplionoides*. Schrank.

*Gen. 25. *Sterena*. Walk.

**St. cyanea*. Walk. ex *Natasia*.

Gen. 26. *Argyroneta*. Latr. Walk.

A. aquatica. Latr. Walk. Linn. Fabr. etc.

Diese erste Lieferung soll als Muster ihrer folgenden Schwestern dienen.

Mehr als hundert Exemplare einer Lieferung werden nicht gefertigt, und daher auch ohne Bestellung und baarer Bezahlung kein Exemplar abgesendet. — Wer sich an mich unmittelbar wendet, und den Betrag sogleich beilegt, erhält die Lieferung um 2 fl. — Rhein. oder 1 Thlr. 3 Gr. Sächs. Wem aber dieses nicht gefallen sollte, kann es durch die ^{L. J. Lehner} J. A. Steinische Buchhandlung dahier, jedoch, wie sich von selbst versteht, mit erhöhten Preisse, erhalten; und die auswärtigen Herren Buchhändler können solches einzig und allein nur durch oben genannte Buchhandlung beziehen, da ich mich mit jährlichen Abrechnungen nicht befassen kann und will.

Diejenigen Entomologen, welche mit meinem Freunde, Herrn Sturm dahier in Verbindung stehen, belieben an diesen den Betrag einzuliefern, welcher dann die Exemplare an sie zu versenden, die Güte haben wird.

Haec prima fascicula sequentium sit exemplar.

Supra centum exemplaria unius fasciculae non conficiuntur, nec igitur sine jussu ac pecunia praesente ullum mittitur. Qui directe vertitur ad me, datque summam; fasciculam accipit: 2 fl. — aut 1 Thl. 3 Gr. in Monet. Saxon. Quod autem cui non placeat, Norimbergae ex officina libraria ^{L. J. Lehner} J. A. Steiniana, tamen, ut per se intelligitur, pretio aucto accipere potest. Bibliopolae externi hoc opus solum ex officina appellata possunt petere, quia in rationibus annuis versari nec queo, nec volo.

Entomologis cum Sturmio domino conjunctis placeat, summam huic dare, qui, exemplaria ut iis mittat, ea erit benignitate.

Schlüsslich füge ich für Sammler noch die Anzeige bey, daß ich immer eine große Anzahl, nach meiner Methode ausgetrockneter Spinnen zum Tausch gegen Käfer, Wanzen, Spinnen und Scorpionen vorrätig habe, weswegen sich solche an mich wenden können. Auch für diejenigen, welche keine Gelegenheit zum Tauschen haben, kann ich sowohl einzelne Arten, als auch ganze Sammlungen gegen billige Bezahlung abgeben. Kataloge werden unentgeltlich auf Verlangen versendet.

Briefe und Gelder erbittet man sich aber, so weit es seyn kann, portofrey.

Nürnberg, im Monat April 1820.

Dr. Carl Wilhelm Hahn.

Postremo collectoribus do indicium, semper magnam araneorum ex ratione mea siccatarum habere me paratam multitudinem ad permutationem cum eleuthratis, cimicibus, araneis scorpionibusque, quare hi ad me converti possunt. Eis quoque, qui permutandi careant occasione, et singulas species, et cunctas collectiones cum pecunia aequa dare possum. Catalogi nulla mercede petiti mittuntur.

Litterae autem et pecuniae, quoad licet, sine mercede perferendarum mitti postulatur.

Scribam, Norimbergae, mense Aprilis, MDCCCXX.

Dr. Carolus Guilielmus Hahn.



E r s t e s H e f t.

Die bandirte Würgspinne.

Mygale fasciata. Latr. Walk.

Der Hinterleib mit einen breiten hell-grau-bräunlichen Längesstreifen, welcher mit einen dunkelbraunen Saum umgeben ist, versehen.

M. Abdomine fascia lata, grisea, longitudinali, marginibus sinuata.

Mygale fasciata.

Latr. Gen. Curast. et Insect. Tom. I. p. 85.

Walk. Tabl. des Aran. p. 3.

— Hist. nat. des Aran. 4. Liverat. Pl. 1.

Sie bewohnt die Insel Ceylon.

Habitat in Insula Ceylon.

Nach einem im Naturalien-Cabinette der Universität zu Erlangen sich befindlichen weiblichen Exemplare ist die Abbildung gemacht worden.

Ad exemplar femineum quod est in museo rerum naturalium academiae Erlangense facta est icon.

Die Blond'sche Würgspinne.

Mygale Blondii. Latr.

Schwarzbraun, sehr haarig, die Füße ohne Stacheln.

M. Fusco nigra, hirsutissima. Pedibus tubereulo nullo.

Mygale Blondii.

Latr. Gen. Curast. et Insect. Tom. I. p. 85.

Palisot-de-Beauvois Insect. Tom. I. 3^{me}. Liverat.

p. 155. Apters. Pl. III. fig. 2.

Mygale Blondina.

Walk. Tabl. des Aran. p. 3.

Diese Würgspinne bewohnt Cajenne, die Insel St. Domingo und auch Surinam.

Habitat Cajennae, Insula St. Domingo et Surinamiae.

Unsere Abbildung ist nach einem in meiner Sammlung sich befindlichen weiblichen Individuum verglichen, und aus Palisot-de-Beauvois Insecten-Werk copirt.

Icon nostra cum individuitate feminea quae est in collectione mea, comparata est, et ex Palisot-de-Beauvois insectorum opere depicta.

Die Vogel-Würgspinne.

Schwarzbraun, sehr haarig; die Haare lang; die Fresszangen von unten und die Spitzen aller Füße mit fuchsrothen Haaren besetzt; die Fußsohlen breit; die Klauen nicht vorragend.

Mygale avicularia. Latr. Gen. Curast. et insect. Tom. I. p. 82.

Walk. Tabl. des Aran. p. 4.

Aranea avicularia. Cmel. Linn. syst. nat. I. V. p. 2957. Nr. 80.

Fabr. Ent. syst. Tom. II. p. 424. Nr. 63.

Aranea hirtipes. — — — — p. 428. Nr. 77. Exempl. juven.

Kleemanns Beiträge p. 85. Tab. XI. und XII.

Man findet diese Art im mittägigen Amerika.

Habitat in America meridionali.

Die Abbildung stellt einen Mann vor, und ist nach einem in meiner Sammlung sich befindlichen Exemplare genommen.

Icon representat marem, et ex exemplare, quod est in collectione mea, tracta est.

Die krebbsartige Würgspinne.

Gelbbraun, haarig, das dritte Glied der Füße unten mit zwei einwärts gebogenen Stacheln versehen.

Mygale canerides. Latr. Gen. Curast. et insect. Tom. I. p. 83.

Palisot-de-Beauvois Insects. Tom. I. 8^{me}. Liverat.

p. 135. Apteres Pl. III. fig. 1. mas.

Man findet sie auf St. Domingo.

Habitat in St. Domingo.

Die Abbildung stellt einen Mann vor, und ist aus Palisot-de-Beauvois Werk copirt, nachdem dieselbe mit einem in der Sammlung meines Freundes Herrn Sturm dahier sich befindlichen Exemplare verglichen, und richtig befunden war.

Mygaleconcrides. Latr.

M. Fusca, hirta, Pedibus articulo tertio subtus tuberculato; tuberculo biunguiculato.

Icon representat marem, et, ex Palisot-de-Beauvois opere depicta, postquam illa cum exemplare, quod est in Sturmii domini amici mei hac in urbe habitantis comparata collectione erat, rectaque putata.

Tribus I. Gen. 1. *Hygale*. Fam. 1. Plantigrades



Hygale fuscata, Latr. Form.

Tribus 1. Gen. 1. *Hijgale*. Fam. 1. *Plantigrades*



Hijgale Blondin Latr

Auctor pinx. et del.

Tribus, 1. Gen. 1. *Mygale*. Fam 1 Plantigrades



Mygale concinna Latr

Tribus 1 Gen 1. Mygale. Fam 1. Plantigrades.



Mygale aricularia. Latr

A. B magnitud. natural. a Oculi. b. Mandibula. c. Genital: mare

Argumentum.

Inhalt.

Atypus Sulzerii, Latr.

Die Sulzerische Mordspinne.

Atypus Sulzerii, Latr. Gen. Curast. et Insect. I. p. 85. Sp. 1.

Oletera Atypus, Walk. Tabl. des Aran. p. 7. Nr. 1.

Aranea picca, Sulzers abgek. Gesch. der Insect. Pl. 30. fig. 2.

Habitat in Franco-Gallia, in Helvetia, nec non in nonnullis Bavariae atque Franconiae regionibus.

Icon est facta ad exemplar masculum, quod est in collectione copiosa, qua gaudet Dom. Sturm, Norimbergae.

Es findet sich diese Art in Frankreich, in der Schweiz, auch in einigen Orten Baierns und Frankens.

Die Abbildung ist nach einem männlichen Exemplare genommen, welches sich in der sehr reichen Sammlung des Herrn Sturm zu Nürnberg befindet.

Eresus cinnaberinus, Walk.

Die rothfüßige Suchspinne.

Eresus cinnaberinus, Walk. Tabl. des Aran. p. 21.

Aranea 4-guttata, Rossi faun. Etr. tom. 2. p. 135. Pl. I. fig. 8. et 9.

Aranea moniligera, Villers ent. Tom. 4. pag. 128. Tab. II. fig. 8.

Habitat in Hispania, Lusitania, Franco-Gallia, Italia etiam in Hungaria.

Ad exemplar collectionis modo laudatae icon est facta.

In Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und auch in Ungarn findet sich diese Suchspinne.

In vorbemerakter Sammlung befindet sich das Exemplar, nach welchem die Abbildung gemacht wurde.

Eresus annulatus, mihl.

Die ringelfüßige Suchspinne.

Schaefers icon. Pl. 32. fig. 20.

Haec species, a priori perspicue diversa, habitat, quod ego sciam, solummodo in Bavaria et quidem in regione Aichstadii atque Ratisbonae.

Icon est delineata ad exemplar collectionis meae.

Diese von voriger bestimmt verschiedene Art, findet sich meines Wissens nur in Baiern, und zwar um Eichstätt und Regensburg.

Das Original, wonach die Abbildung genommen ist, befindet sich in meiner Sammlung.

Thomisus Diana, *Walk.* Die jagende Krappenspinne.

Thomisus Diana, *Walk. Tabl. des Aran. p. 23.*

Aranea Diana, *Walk. Faun. Paris. Tom. 2. p. 232.*

Habitat in Franco-Gallia et in Germania,
in plantis umbellatis.

Exemplar, ad quod iconem feci, est in col-
lectione mea.

Man findet diese Art in Frankreich und
Deutschland auf Schirmpflanzen.

Das Original, wonach ich die Abbildung fer-
tigte, besitze ich in meiner eigenen Sammlung.

Thomisus Hermannii, *miki.* Die Hermannische Krappenspinne.

Vir illustris Hermannus, Professor Argento-
ratensis, cujus mors doctrinae rerum naturae
investigatorem magnum eripiebat, primus hanc
speciem in regione urbis, in qua vivebat, inve-
nit; equidem hujus exemplar inveni haud pro-
cul ab urbe Norimberga mense Augusti anni
millésimi octingentesimi decimi noni in prato;
ad quod exemplar icon facta est.

Der für die Naturwissenschaft leider zu früh
verstorbene Professor Hermann zu Straßburg,
entdeckte diese Art zuerst in seiner Gegend;
und ich fand ein Exemplar bei Nürnberg im
August 1819 auf einer Wiese im Grase, nach
welchem auch die Abbildung entworfen ist.

Thomisus dauci, *Walk.* Die Möhren-Krappenspinne.

Thomisus dauci, *Walk. Tabl. des Aran. p. 25.*

Aranea dauci, *Walk. Faun. Paris. Tom. 2. p. 232.*

In plantis umbellatis circa urbem Norimbergam,
species haud rara; nec non in Franco-Gallia habi-
tans. — Ex collectione mea.

Auf Schirmpflanzen in der Gegend von
Nürnberg nicht sehr selten, auch in Frankreich.
Aus meiner Sammlung.

Epeïra clavipes, *Latr. Walk.* Die dickfüßige Radspinne.

Epeïra clavipes, *Walk. Tabl. des Aran. p. 54.*

— — — *Latr. Gen. Curast. et Insect. I. p. 104.*

Aranea clavipes, *Fabl. Ent. syst. 2. p. 420.*

In America meridionali.

Mas ex collectione mea; femina ex Museo
rerum naturalium Academiae Erlangensis.

Aus dem mittägigen Amerika.

Der Mann aus meiner Sammlung, und das
Weib aus dem Naturalien-Cabinet der Univer-
sität zu Erlangen.



Tribus I. gen. 2. Atypus.



Atypus Sulzerii, Latr.

a. Magnitudo naturalis, A. Eadem aucta. b. Situs oculorum. c. Mandibulae.

Auct. pinx. et del.

Tribus II. Gen. 8. *Eresus*.





A, a, Eresus cinnabarinus, Walk. B, b, Eresus annulatus, miki.

c. Situs oculorum.

Auct pinx. et del.


Tribus II Gen 10 *Thomisus* Sect. 1. *Heteropodae*.



a, *T. Thomisus Diana*, Walk. b, *B. Thomisus Hermannii*, mch
c, *C. Thomisus dauci*, Walk. d, *Situs oculorum*.

Aut penx. et col.

Tribus II. Gen 18. *Epeira* Fam 1. *Elongatae cylindricae*.



Epeira clavipes Latr. Walk.
a.) Masc. b.) Foem. c.) Situs oculorum.

Auct. pinx. et del.

Lectori benevolo P. S.

A n z e i g e.

Ex opere, magno quod applausu favoreque
ubique recipiebatur;

Monographia Araneorum a Dr.
Carolo Guilielmo Hahn. 4 maj.

intitulato, fascicula prima atque secunda pu-
blicam in lucem prodiit, impensis Auctoris
doctissimi. Diversae autem causae eum move-
bant, ut opus, cujus negotium adhuc nobis erat
traditum, ejusque edendi jus plane nobis con-
cederet.

Investigatoribus amicisque rerum naturali-
um hujus operis fasciculam tertiam tradentes,
sumtibus edendi susceptis, atque Auctoris doct.
aequitate pretio valde minuendo nos esse, in-
dicamus.

Constat igitur ex hoc die fascicula quae-
vis, quatuor tabulis belle pictis ornata, in 4to
maj. 2 fl. aut 1 thal. 8 gross in Monet. Saxon.,
quo pretio ea per omnes honestas officinas libra-
rias et indigenas et alienigenas a nobis peti po-
test. Subscriptio locum non habet, si quis
autem praesenti pecunia nos directe adire ve-
lit, ei deductionem justam offerimus.

Quae quum ita sint, bene speramus, fore
ut hoc opus maxime sumtuosum multos fautores
non tantum in Bavaria sed etiam in terris aliis
sibi paret; quae res maximo nobis esset gaudio
nec non incitamento, operis in futurum quam
maxime perficiendi.

Von dem mit so vielem Beifall aufgenom-
menen Werke:

Monographie der Spinnen von
Dr. Carl Wilhelm Hahn. gr. 4.

erschien das erste und zweite Heft auf Kosten
des Herrn Verfassers in dessen eigenem Verlage.
Verschiedene Ursachen aber, brachten densel-
ben zu dem Entschlus, uns dasselbe, statt da-
ß wir es bisher nur in Commosion hatten, gänz-
lich zu überlassen und das Verlagsrecht an uns
abzutreten.

Indem wir nun Naturforschern und Freun-
den der Naturkunde, das dritte Heft dieses Wer-
kes übergeben, zeigen wir zugleich an, da-
ß wir durch die Uebernahme des Verlagsrechts,
und durch die billigen Forderungen des gelehr-
ten Herrn Verfassers in den Stand gesetzt wur-
den, den bisherigen Ladenpreis bedeutend her-
absetzen zu können.

Es kostet daher vom heutigen Tage an, je-
des Heft mit 4 sehr fein illuminirten Kupfer-
tafeln in gr. 4to. im Ladenpreis 2 fl. rhn. oder
1 Thaler 8 Groschen sächsisch Courrt. und ist
für diesen Preis durch alle in- und ausländi-
sche solide Buchhandlungen, von uns zu be-
ziehen. Ein Subscriptionspreis findet nicht statt,
doch wollen wir bei directer Bestellung von
uns, und gegen gleich baare Zahlung, einen
mäßigen Rabatt geben.

Wir hoffen durch die Preis-Erniedrigung den
Absatz und die Verbreitung dieses schätzbaren
Werkes noch sehr zu vermehren, und würden
uns freuen, wenn wir durch recht große Theil-
nahme an diesem, mit vielen Kosten verbun-
denem Unternehmen, sowohl im In- als im
Auslande, recht thätig unterstützt werden sollten.

Insuper et nobis mentio est facienda operis
ab eodem Auctore, quod sub titulo:

Zugleich machen wir die verehrten Herren
Abnehmer; noch auf ein Werk aufmerksam,
das ebenfalls in unserm Verlage, von demsel-
ben Herrn Verfasser, unter dem Titel:

Dr. C. W. Hahns Vögel aus Asien, Africa, America und Neu-
holland, in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen;
(blos mit deutschem Text.)

impensis nostris in lucem prodit. Ex hoc opere
usque ad hunc diem fasciculae decem editae
sunt; quarum quaeque cum sex tabulis, colo-
ribus eleganter ornatis, constat 2 fl. 24 cr. aut
1 thal. 8 gross. in Monet. Saxon. Qui autem
argento praesenti atque mercede pecuniae per-
ferendae soluta nos ipsos adire voluerit, fasci-
culam quamvis pretio subscriptionis: 1 fl. 30 cr.
aut 20 Gross. in Monet. Saxon. accipiet.

Hujus operis autem mandata daturi, nobis
sunt rogandi, ut hoc faciant, priusquam volu-
men primum ad finem perducatur.

Norimberga Calendis Aprilis
MDCCCXXII.

Officina libraria Lechneriana.

herauskommt. Bisher sind davon 10 Hefte er-
schienen und jedes Heft mit 6 fein illum. Ku-
pfer tafeln, in gr. 4to., kostet im Ladenpreis
2 fl. 24 kr. rhn. oder 1 Thlr. 8 Gr. sächs. Courr.
Wer sich jedoch directe an uns wendet, und
den Betrag gleich baar und franco einsetzt,
soll jedes der bereits erschienenen Hefte, noch
für den Subscriptionspreis von 1 fl. 30 kr. rhn.
oder 20 Groschen sächs. Crt. erhalten.

Die Bestellungen müssen aber noch vor dem
Schluss des ersten Bandes gemacht werden.

Nürnberg, am 1. April 1822.

J. L. S. Lechner'sche
Buchhandlung.

Fascicula tertia.

Drittes Heft.

Argumentum.

Inhalt.

Tab. I.

Tafel 1.

Mygale calpeiana, *Walk.*

Die Gebürs-Würgspinne.

Walk. Tabl. des Aran. p. 5. Nr. 6.

Latr. Gen. Curast. et Insect. I. p. 85. spec. 7.

Haec species usque ad hoc tempus sola in regione, qua sita est Gibraltaria, habitat.

Man fand diese Art bisher nur in der Gegend von Gibraltar.

Ex collectione mea.

Aus meiner Sammlung.

Tab. II.

Tafel 2.

Lycosa tarantula, *Walk.*

Die Tarantel-Jagdspinne.

Walk. Tabl. des Aran. p. 11. Nr. 1.

Aranea tarantula, *Fabr. Syst. Ent. II. p. 425.*

Gmel. Linn. Syst. Nat. I. 2. p. 1035.

Habitat in Hispania, Lusitania, Italia et in Franco-Gallia meridionali.

In Spanien, Portugal, Italien und südlichen Frankreich.

Icon facta est ad exemplar collectionis Dom. Sturm, Norimbergae.

Aus der Sammlung des Herrn Sturm zu Nürnberg.

Tab. III.

Tafel 3.

Lycosa maculata, *mihi.*

Die gefleckte Jagdspinne.

Species haec non est rara, habitatque in regionibus paludosis sub lapidibus circa urbem Monachii.

In sumpfigen Gegenden unter Steinen um München, nicht sehr selten.

Ex collectione mea.

Aus meiner Sammlung.

Lycosa Waglerii, mihi.

In campis fluvio Isarae adjacentibus circa urbem Monachii sub lapidibus; species rara.

Amicus meus, Dr. Wagler, exemplar primum hujus speciei novae aestate anni elapsi detexit, idque mihi in excursionem nostram tradidit; quam ob rem hanc speciem ex hoc rerum naturalium investigatore sagacissimo nominabam.

Die Waglers-Jagdspinne.

In den Isar-Auen um München unter Steinen, selten.

Mein Freund, Herr Dr. Wagler dahier, entdeckte das erste Exemplar dieser neuen Art, im Sommer vorigen Jahres, und übergab mir solches auf unserer gemeinschaftlichen Excursion, daher nannte ich diese Art diesem eifrigen Naturforscher zu Ehren.

Tab. IV.

Epeïra furcata, mihi.

Habitat Cajennae.

Ex collectione Dom. Sturm, Norimbergae.

Tafel 4.

Die gegabelte Radspinne.

Aus Cajenne.

Aus der Sammlung des Herrn Sturm in Nürnberg.

Epeïra sexspinosa, mihi. Die sechsstachelichte Radspinne.

Habitat Surinamæ.

Ex collectione mea.

Aus Surinam.


Aus meiner Sammlung.

Tribus I Gen 1 *Miggale* Fam 2 *Digitigrades inermes*



Miggale calpeiana, Walth. a. *Pinus oculatorum* b.

Tribus II Gen 4 *Lycosa* Fam 1 *Terricclae*



Lycosa Taranulula, Latr. Wälf.

Tribus II Gen. 4 *Lycosa* Fam. 1. *Terricolae*

1.a.



2.a.



1 *Lycosa maculata* mihi 2 *Lycosa Waglerii*, mihi.

Tribus II Gen 18. *Epeira* Fam. g. *Spincsae*



a, A, b. *Epeira furcata*, mihi. b, B. *Epeira sexspinosa*, mihi

N o t a n d u m.

Fortunae partim adversae, partim priores fasciculi haud frequenter venditi impediverunt, quo minus hoc opus, quod historiae naturalis studium non mediocriter juvabit, continuaretur. Meliora vero auspicia emtorumque incrementa facultatem dederunt, ut hicce quartus fasciculus in lucem proferretur.

Multi quum optarent, ut operis citius perficiendi causa tabulae fasciculorum sequentium plures icones, quam priores, continerent, illorum votis libenter respondens, huic quarto fasciculo quatuordecim icones adjeci. Impensis autem hoc modo auctis, singuli fasciculi inde ab hoc quarto constant 3 fl. — rhn. vel 2 thlr. — saechs. Crt. Me ipsum vere adeuntibus vendam singulos fasciculos 2 fl. 24 kr. vel 1 thlr. 12 ggr.; alii bibliopolae hoc commodum praestare nequeunt.

Nuntium annecto, me perpetuo araneas cura Dr. *Hahnii* optime praeparatas in promtu habere, quas aequae ac reliqua naturalia et vendo, et aliis permuto. Catalogus naturalium, quas possideo, hanc rem clarius definit.

N a c h r i c h t.

Durch widrige Verhältnisse eines Theils, und zu wenigen Absatz andern Theils, kam es, daß die Fortsetzung dieses für die Naturwissenschaft gewiß sehr wichtigen Werkes bisher unterblieb. Nachdem sich aber endlich günstigere Aussichten zeigen, und die Abnehmer sich nach und nach mehren, so erscheint hiemit das vierte Heft.

Da indessen von mehreren Seiten der Wunsch geäußert wurde, daß zur frühern Beendigung des Ganzen mehr Abbildungen als bisher in jedem Hefte vorkommen möchten, so wurde diesem Begehren gerne entsprochen, und es enthält das vierte Heft vierzehn Abbildungen. Natürlich vermehrt dies aber auch die Unkosten, und ich kann daher, von diesem vierten Hefte an, den Preis eines jeden (Hefes) nicht geringer als 3 fl. rhn. oder 2 Thlr. saechs. stellen. Bloß in dem Falle, wenn man sich directe an mich wendet, erlasse ich das Heft für 2 fl. 24 kr. oder 1 Thlr. 12 Ggr.; andere Buchhandlungen können diesen Vortheil nicht gewähren.

Bei dieser Gelegenheit zeige ich an, daß ich mit einem Vorrath von Spinnen, von Herrn Dr. *Hahn* sehr gut präparirt, beständig versehen bin, und solche so wie andere Naturalien sowohl gegen Bezahlung als auch in Tausch gerne abgebe. Mein Naturalien-Katalog sagt darüber das Nähere.

Hanc araneorum monographiam ementibus
commendo quoque novum Dr. *Hahnii* opus:

Icones ad monographiam cimi-
cum etc.

cujus primus fasciculus viginti quatuor tabulas
pictas complectens modo perfectus est. Reliqua
a me sunt audienda. Pretium singulorum fasci-
culorum simile est ac fasciculorum monogra-
phiae araneorum; hoc opus vero a me ipso,
nec ab alio bibliopola redemturis pariter permit-
tam singulos fasciculos 2 fl. 24 kr. rhn. vel
1 thlr. 12 gr. sächs. Crt.

Norimbergae, mense Aprilo

A. MDCCCXXVI.

J. J. Lechnerus,
Bibliopola et naturalium mercator.

Den gütigen Abnehmern dieses Spinnen-
Werkes empfehle ich auch das neue Werk des
Herrn Dr. *Hahn*:

Abbildungen zur Naturgeschichte
der wanzenartigen Insecten;

wovon so eben das erste Heft mit 24 vortreff-
lichen Abbildungen erschienen ist. Eine aus-
führlichere Anzeige davon ist bei mir zu haben.
Der Preis eines Heftes ist mit dem eines Spinnen-
heftes gleich, und wer es von mir selbst,
und nicht durch eine andere Handlung bezieht,
erhält das Heft ebenfalls für 2 fl. 24 kr. rhn.
oder 1 Rthlr. 12 gr. sächs. Crt.

Nürnberg, im April 1826.

J. J. Lechner,
Buch- und Naturalien-Händler.

Fasciculus quartus.

Viertes Heft.

Argumentum.

Inhalt.

Attus scenicus, Walk.

Die Harlequins Hüpfspinne.

Salticus scenicus, Latr.

Aranea scenica, Linn. Fabr.

Haec species habitat haud rara in tota fere Europa, in muribus et ligno et lapidibus exstructis etc.

Diese fast in ganz Europa einheimische Art findet sich an Bretterwänden, Mauern etc. ziemlich häufig.

Attus limbatus, Mihi.

Die gesäumte Hüpfspinne.

Hanc speciem nusquam descriptam invenimus circa Monachium et Norimbergam in silvis in arborum truncis.

Diese noch nirgends beschriebene Art fand ich um München und Nürnberg in Wäldern an alten Baumstümpfen, aber selten.

Attus fasciatus, Mihi.

Die gestreifte Hüpfspinne.

Hanc novam speciem in silvis circa Norimbergam invenimus.

Ich entdeckte diese neue Art um Nürnberg in Wäldern.

Attus cupreus, Walk.

Die kupferglänzende Hüpfspinne.

In plurimis circa Norimbergam dumetis aestate haud rara.

Auf Hecken im Sommer allenthalben um Nürnberg nicht selten.

Attus cordicalis, Mihi.

Die Rinden-Hüpfspinne.

Plerumque haec species circa Norimbergam habitat in annosis salicibus, sub quarum cortice hieme versatur.

Gewöhnlich findet sich diese Spinne an alten Weidenbäumen um Nürnberg und überwintert unter der Rinde derselben.

Attus pubescens, Walk.

Die feinhaarige Hüpfspinne.

Aranea pubescens, Fabr.

Plurimis Germaniae et Galliae locis in muribus ligneis non rara habitat haec species.

An Bretterwänden findet man diese Hüpfspinne allenthalben in Deutschland und Frankreich nicht selten.

Thomisus griseus, Mihi.

Haec nova species habitat frequens in pinis circa Norimbergam.

Thomisus laevipes.

Aranea laevipes. Linn. Fabr.

In Germania et Sueciā in truncis arboribus muribusque ligneis.

Thomisus brevipes, Mihi.

Hanc speciem nusquam descriptam circa Norimbergam in dumetis inveni.

Die graue Krappenspinne.

Auf Föhrenbäumen um Nürnberg findet sich diese neue Art nicht selten.

Die leichtfüßige Krappenspinne.

An alten Balken und Bretterwänden in Deutschland und Schweden.

Die kurzfüßige Krappenspinne.

Auf Hecken um Nürnberg entdeckte ich diese noch nirgends beschriebene Art.

Theridion 4-punctatum, Walk.

Theridion 4-punctatum. Latr.

Aranea bipunctata. Linn. Fabr.

Aedium stabulorumque locis obscuris non rara.

Die viermalpunctirte Webespinne.

In Häusern und Ställen an dunklen Orten nicht selten.

Theridion maxillosum, Mihi.

Die Kinnladen Webespinne.

Sub lapidibus et in gramine haec species non rara circa Norimbergam et Monachium habitat. Quod attinet ad abdominis colorem, maxime variabilis est.

Unter Steinen und im Grase findet sich diese Art um Nürnberg und München nicht selten. Sie ändert hinsichtlich der Farbe des Hinterleibs sehr ab.

Theridion redimitum, Walk.

Die gegürtelte Webespinne.

Nonnullis Germaniae, Galliae et Sueciae locis haec species in dumetis habitat frequens.

In Deutschland, Frankreich und Schweden kommt diese Art auf Hecken an manchen Orten häufig vor.


Aranea lineata et ovata Fabr. Linn. varietates tantum hujus speciei sunt.

Aranea lineata und ovata Fabr. Linn. sind nur Abweichungen dieser Art.

Omnes species in hoc fasciculo delineatae sunt in collectione mea.

Alle in diesem Hefte abgebildete Arten besitze ich in meiner Sammlung.

Tribus II, Gen. 9 Attus Fam. 1 Saltatoriae.



a. A. A. scenicus, Linn. Masc.

b. B. A. scenicus, Linn. Fem.

c. C. A. limbatus, Miki.

d. D. A. fasciatus, Miki.

Tribus. II. Gen. 9. Attus Saltatoriae. Fam. 1.



a. A. A. cupreus, Wlk. Mas.

b. B. A. cupreus, Wlk. Fem.

c. C. A. cordialis, Muls.

d. D. A. pubescens, Fabr.

Tribus. II. Gen. 10. Thomisus




a. A. T. griecus Miki.

b. B. T. laevipes, Linn.

c. C. T. brevipies, Miki.

Tribus II Gen. 22.

Cheridion



a. *A. T. 4-punctatum*, Wlk.

b. *B. T. maxillosum*, Miki.

c. *C. T. redimitum*, Wlk.

Fasciculus quintus.

Fünftes Heft.

Argumentum.

Inhalt.

T a b. I.

Lycosa Ehippium, Mihi.

In palustribus; haud raro.

Lycosa lapidicola, Mihi.

In littore piscinarum sub lapidibus; hac in regione vulgaris.

Lycosa saccata, Linn.

Prope ripas et in humidis pratis; vulgaris.

Tafel I.

Die gesattelte Jagdspinne.

An sumpfigen Orten; nicht selten.

Die Stein-Jagdspinne.

Am Ufer der Teiche unter Steinen; in hiesiger Gegend gar nicht selten.

Die sacktragende Jagdspinne.

Aranea saccata, Linn. Fabr. etc.

Lycosa saccata, Walkenaer. Latr.

An Ufern und auf feuchten Wiesen; gemein.

T a b. II.

Dolomodes mirabilis, Walkenaer.

Aranea obscura, Fabr.

Dolomodes mirabilis, Walk. Latr.

In silvis et fruticetis, aequae ac in gramine.
Ad abdominis colorem quod attinet, variat.

In Wäldern und Gebüsch, auch im hohen Grase. Aendert hinsichtlich der Färbung des Hinterleibes sehr ab.

T a b. III.

Attus Sloani, Latr.

Aranea Sloani, Scop.

Attus Sloani, Latr.

Per Europam meridionalem, in muris et ligno vetere.

Tafel III.

Die Sloanische Hüpfspinne.

Im südlichen Europa, an Mauern und altem Holze.

Attus semilimbatus, Mihi.

Hofmannus, qui per itinera res naturales colligit, hoc novum genus circa Neapolin deprehendit.

Die halbeingefasste Hüpfspinne.

Herr Hoffmann, ein reisender Naturalien-Sammler, entdeckte diese neue Art um Neapel.

Attus pulchellus, Mihi.

Hanc bellam araneam hac in regione deprehendi, perraro tamen in parietibus ligneis vestustis.

Die schöne Hüpfspinne.

Ich entdeckte diese niedliche Spinne in hiesiger Gegend, wo sie jedoch sehr sparsam an alten Bretterwänden vorkommt.

T a b. I V.

Clubiona holosericea, Linn.

Aranea holosericea, Linn. Fabr.

Clubiona holosericea, Walk. Latr.

Sub cortice veterum salicum; vulgaris.

T a f e l I V.

Die feinhaarige Rindenspinne.

Unter der Rinde alter Weidenbäume; gemein.

Clubiona Aethiops, Mihi.

In silvis sub cortice truncorum, circa Monacum; raro.

Die Mohren-Rindenspinne.


In Wäldern unter der Rinde alter Baumstämme, um München; selten.

Clubiona rubripes, Mihi.

Hoc novum genus in Alpibus Bavaricis comprehendi sub lapidibus.

Die rothfüßige Rindenspinne.


Diese neue Art entdeckte ich in den bayerischen Alpen unter Steinen.



a. A. *L. Ephippium*, Michx. b. B. *L. lapidicola*, Hahn.

c. C. *L. saccata*, Linn.

Tribus II Gen. 5. Dolomedes, Sylvariae. Fam. 2



a. A. Dolomedes mirabilis, Wälkner. B. C. variet.

Tribus II Gen. g. Attus Saltatoriae. Fam. 1.




a. A. A. Sloani, Latr.

b. B. A. semilimbatus, Miki.

c. C. A. pulchellus, Miki.

Tribus II Gen 12.

Clubiona.



a. A. C. helosericata, Linn.

b. B. C. Aethiops, Miki.

c. C. C. rubripes, Miki.

Fasciculus sextus.

Argumentum.

Fig. a. A. 1.

Thomisus citreus, De Geer.

In pratis, in tota paene Europa, non rara.

Fig. b. B.

Thomisus calycinus, Linn.

Habitat cum specie priori eodem loco, et varietas esse mihi videtur.

Fig. c. C. 2.

Thomisus cristatus, Latr.

Haec species in Europa meridionali tantum habitat.

Fig. a. A. 1.

Thomisus Ulmi, mihi.

In Ulmarum frondibus hanc speciem novam ad Norimbergam inveni.

Fig. b. B.

Thomisus lateralis, mihi.

Habitat rara in fruticetis sylvarum circa Norimbergam.

Fig. c. C.

Thomisus Pini, mihi.

In pinis circa Norimbergam, non rara.

Fig. a. A. 1.

Theridion melanurum, mihi.

In saxis ad Muggendorfum, rarissima.

Fig. b. B. 2.

Theridion leuconotum, mihi.

In dumetis circa Norimbergam, non rara.

Fig. c. C. 3.

Theridion ornatum, mihi.

Circa Norimbergam in virgulis et dumetis frequens.

Fig. a. A. 1.

Theridion dorsiger, mihi.

In gramminibus et fruticetis rarior.

Fig. b. B. 2.

Theridion nebulosum, mihi.

In dumetis circa Norimbergam, non frequens.

Fig. c. C. 3.

Theridion tibiale, mihi.

In pinis et abietibus circa Norimbergam, frequens.

Fig. d. D. 4.

Theridion rufipes, Linn.

In variis dumetis ubique locorum frequentissima.

Omnes species in hoc fasciculo delineatas proprias in collectione mea possideo.

Sechstes Heft.

Inhalt.

Bild a. A. 1.

Die zitronengelbe Krappenspinne.

Auf Wiesenblumen fast in ganz Europa, nicht selten.

Bild b. B.

Die Blumen-Krappenspinne.

Findet sich mit voriger Art an gleichen Orten, und scheint nur Abänderung derselben zu sein.

Bild c. C. 2.

Die gekrönte Krappenspinne.

Diese Art findet sich nur in den südlichen Gegenden von Europa vor.

Bild a. A. 1.

Die Ulmen-Krappenspinne.

Auf niedern Ulmengebüschten entdeckte ich diese neue Art in der Gegend von Nürnberg.

Bild b. B.

Die seitenstreifige Krappenspinne.

Um Nürnberg in Wäldern auf niedern Gesträuchen, aber selten.

Bild c. C.

Die Föhren-Krappenspinne.

Auf Föhrenbäumen um Nürnberg gar nicht selten.

Bild a. A. 1.

Die schwarzasterige Webespinne.

Bei Muggendorf an Felsen, sehr selten.

Bild b. B. 2.

Die weisrückige Webespinne.

Um Nürnberg an Hecken, nicht sehr selten.

Bild c. C. 3.

Die gezierte Webespinne.

An Gesträuchen und Hecken in hiesiger Gegend gemein.

Bild a. A. 1.

Die hellrückige Webespinne.

Auf hohen Grase und niedern Gesträuchen, nicht sehr gemein.

Bild b. B. 2.

Die wolkiige Webespinne.

In hiesiger Gegend an Hecken, nicht häufig.

Bild c. C. 3.

Die Schienen-Webespinne.

Auf Föhren und Fichten, gemein um Nürnberg.

Bild d. D. 4.

Die rothfüßige Webespinne.

Auf allerlei nidern Gesträuchen allenthalben gemein.

Alle in diesem Hefte bildlich dargestellten Arten besitze ich in meiner Sammlung.

Dr. Hahn.

Tribus II. Gen. 10. Thomisus. Fam. 3 Caneroides.




Fig. a. A. 1. T. citreus, De Geer. Fig. b. B. T. calycinus Linn.

Fig. c. C. 2. T. cristatus, Walk.

Tribus II. Gen. II. Thomisus Fam. 3 (auriculis).




Fig. a. A. A. T. Ulmi, Hahn. Fig. b. B. T. lateralis, Hahn.

Fig. c. C. T. Pini, Hahn.

Tribus II. Gen. 22. Theridion. Fam. 3. Turgidae.



Fig. a. A. 1. T. melanurum, Hahn. Fig. b. B. 2. T. leuconotum, Hahn.

Fig. c. C. 3. T. ornatum, Hahn.

Tribus II . Gen. 22. Theridion. Fam. 3. Turgidae .




Fig. a . A. 1. T. nebulosum, Hahn . Fig. b . B. 2. T. dorsiger, Hahn .
Fig. c. C . 3. T. tibiale, Hahn . Fig. d . D. 4. T. rufipes, Linn .

Siegentes Heft.

Inhalt.
Bild. c.

Steinschlüpfspinne.

Unter Steinen in gebirgigen Gegenden, nicht selten! Aus d. Gegend von Hildbrach.

Bild. b.

Hecken-Schlüpfspinne.

Im Sommer auf Hecken, wo sie in zusammen/gespinnenen Blättern lebt. In hiesiger Gegend nicht selten!

Bild. a.

Punktfleckiche Schlüpfspinne.

Auf niedern Fehengebüschen in hiesiger Gegend, aber nicht gemein!

Bild. c.

Schwarze Sackspinne

Aranea atra, Sulz.

Unter Steinen in Wäldern um Nürnberg sehr selten.

Bild. b.

Braunschünige Sackspinne.

Bei Erlangen unter Steinen an Anhöhen, selten!

Bild. a.

Gräuliche Sackspinne

Aranea cinerea, Panz.

Unter Steinen, in hiesiger Gegend, selten!

Bild. a.

Scorpionartige Krabbenspinne.

Aranea scorpiformis, Fabr.

Auf verschiedenen Schirmpflanzen im Sommer, nicht gemein!

Bild. b.

Vierstreifige Krabbenspinne.

Auf Wiesen welche in Wäldern liegen, sehr selten.

Bild. c.

Abgestutzte Krabbenspinne

Aranea truncata, Pallas.

Aranea horrida, Fabr.

Auf Bäumen in Wäldern, sehr selten!

Bild. d.

Wiesen Krabbenspinne

In hiesiger Gegend nicht selten! auf Wiesenblumen!

Bild. a.

Eingefasste Krabbenspinne

Auf Hecken, in hiesiger Gegend ziemlich selten!

Bild. b.

Rückenfleckige Krabbenspinne.

Aranea dorsata, Fabr.

Thomisus floricolens, Walk.

Auf Wiesenblumen nicht gemein!

Bild. c.

Dunkelfarbige Krabbenspinne.

Aus Italien, wo sie nicht selten ist!

Bild. d.

Rundleibige Krabbenspinne

Aranea globosa, Fabr.

Thomisus rotundatus, Walk.

Auf Hecken bei Erlangen, nicht selten!

Fast sämtliche in dieser Lieferung abgebildete Arten besitze ich in meiner Sammlung, welche immer anschlicher wird!

Wiederholt bitte ich Sammler und Aufseher von Kabinetten, mir seltene Spinnen, besonders ausländische, zum Abilden, mitzutheilen!

Das vchle Heft dieses Werkes ist bereits in Arbeit!

Von meinen Abbildungen der Wälderartigen Insekten ist die erste sehr schöne Lieferung, so eben herausgegeben worden!

J. J. Lechner!

Fasciculus septimus.

Argumentum.

Fig. c.

Clubiona lapidaria, Hahn.

In locis montosis sub lapidibus, frequens. Prope Hildbrach!

Fig. b.

Clubiona dumetorum, Hahn.

In dumetis in foliis abscutis aestate. Circa Norimbergam non rara!

Fig. a.

Clubiona punctata, Hahn.

In fruticibus punctis depressis, haud infrequens.

Fig. c.

Draffus ater, Sulz.

Aranea atra, Sulz.

In fylis sub lapidibus, circa Norimbergam rarissime.

Fig. b.

Draffus tibialis, Hahn.

Circa Erlangam ad tumulos sub lapidibus, infrequens.

Fig. a.

Draffus cinereus, Panzer.

Aranea cinerea, Panzer.

Sub lapidibus apud nos infrequens.

Fig. a.

Thomisus scorpiformis, Fabr.

Aranea scorpiformis, Fabr.

In plantis umbellatis variis, aestate infrequens.

Fig. b.

Thomisus quadrilincatus, Hahn.

In pratis fylvaticis, rarissime.

Fig. c.

Thomisus truncatus, Pallas.

Aranea truncata, Pallas.

Aranea horrida, Fabr.

In arboribus fylvaticis, rarissime.

Fig. d.

Thomisus platensis, Hahn.

Circa Norimbergam frequens, in pratis.

Fig. a.

Thomisus limbatus, Hahn.

In dumetis, circa Norimbergam infrequens.

Fig. b.

Thomisus dorsatus, Fabr.

Aranea dorsata, Fabr.

Thomisus floricolens, Walk.

In pratis infrequens.

Fig. c.

Thomisus obscurus, Hahn.

Habitat in Italia, frequens.

Fig. d.

Thomisus globosus, Fabr.

Aranea globosa, Fabr.

Thomisus rotundatus, Walk.

Circa Erlangam in dumetis, frequens.


Omnis fere in hoc fasciculo Species depictas ipse in mea collectione possideo, quae in diem ercat.

Russus rogo, ut collectores et inspectores collectionum mihi raras, pinces, et exoticas araneas ad depingendum communicent!

Octavus hujus operis fasciculus jam elaboratur!




Primus pulchellus fasciculus iconum cimicum hoc die editus est!

J. J. Lechner!






Clubiona

a. *punctata*, Hahn. b. *dumentorum*, Hahn. c. *lapidaria*, Hahn.






Drassus

a. *cinereus*, Panzer. b. *tibialis*, Hahn. c. *ater*, Sulzer. Fem.
d. *Abdom. infer.*



Thomisus

a. *scorpiiformis*, Fabr. Mac. b. *quatrilineatus*, Hahn. c. *truncatus*, Pallus.
d. *pratensis*, Hahn.



Thomisus

a. *limbatus*, Hahn. b. *dorsatus*, Fabr. c. *obscurus*, Hahn.
d. *globosus*, Fabr.

Achtes Heft.

Inhalt.
Bild. a.

Seidenglänzende Radspinne.

Südliches Frankreich u. Italien.

Bild b.

Höcker - Radspinne. Weib.

An Bäumen in Gärten und Wäldern, fast durch ganz Europa.

Bild. c.

Schreibers Radspinne. Weib.

Auf Gebüschern ohnweit des Wassers in Dalmation.

Bild a u. b.

Vierfleckige Webespinne. Mann u. Weib.

An trocknen Orten unter herumliegenden Schiefer oder Kalksteinen, in gebirgigen Gegenden Frankens. Gewöhnlich in weisse Säckchen eingesponnen.

Bild. c.

Ankergefleckte Webespinne. Weib.

Aranca albomaculata, De Geer. De Villers.
Theridion maculatum, Walk.

In sandigen Gegenden an Anhöhen unter Steinen, in Deutschland, Frankreich und Schweden.

Bild d.

Viermalgezeichnete Webespinne. Weib.

In hiesiger Gegend, auch um Muggendorf, an sandigen Anhöhen unter Steinen, im Frühling und Herbst, nicht häufig.

Bild e.

Kugelleibige Webespinne. Weib.

In hohen Bäumen unter dicken Baumaesten und vorspringenden Mauersteinen, oder an Gartengeländern in Europa.

Bild a u. b.

Längliche Krabbenspinne. Mann u. Weib.

Deutschland, Frankreich, Dänemark u. s. w. In hiesiger Gegend an Ufern der Teiche und an andern feuchten Orten, auf Pflanzen, nicht sehr selten.

Bild. c.

Rautenfleckige Krabbenspinne. Weib.

Vaterland das nemliche wie der vorhergehenden Art. In hiesiger Gegend im Frühling unter abgefallenen Laube u. s. w. nicht gemein.

Bild d.

Gekrönte Krabbenspinne. Weib.

Neapel.

Bild e.

Starke Krabbenspinne. Weib.

Italien, aus den Abruzzern.

Fasciculus octavus.

Argumentum.

Fig. a.

Epeïra sericea. c. 17.

Gallia meridionalis et Italia.

Fig. b.

Epeïra angulata. Fem. Walk.

In arboribus in hortis et sylvis fere in tota Europa.

Fig. c.

Epeïra Schreibersii. Fem. Hahn.

In Dalmatia, in fruticibus aquae vicinis.

Fig. a et b.

Theridion 4-guttatum. Mas et Fem. Hahn.

In locis aridis montosis Francennae sub lapidibus. Plerumque in saculo albo inclusum.

Fig. c.

Theridion anchorum Fem. Hahn.

In Germania, Italia et Suecia in locis sabulosis sub lapidibus.

Fig. d.

Theridion 4-signatum. Hahn.

Prope Norimbergam et Muggendorfum in colliculis sabulosis sub lapidibus aestate et autumno, raram.

Fig. e.

Theridion sysiphum. Fem. Walk.

In Europa in arboribus cavis, sub ramis confertis et lapidibus murorum, et in septis hortorum.

Fig. a. et b.

Thomisus oblongus. Mas et Fem. Müller.

In Germania, Gallia, Dania etc. Prope Norimbergam ad ripas piscinarum, et in altis locis humidis in plantis, frequens.

Fig. c.

Thomisus rhomboicus. Fem. Walk.

Habitat cum praecedente. In nostra regione rere, sub foliis aridis non frequens.

Fig. d.

Thomisus diadema. Fem. Hahn.

Neapoti.

Fig. e.

Thomisus robustus. Fem. Hahn.

In Italia, e montibus Abruzzi.

Bild a.

Fahren - Hüpfspinne, weib.
Deutschland, Schweden, u. s. w. Hier auf niederen
Fehrenbäumen und Büschen, gemein.

Bild b.

Varietät der vorhergehenden Art.

Bild c.

Gelbfüßige Hüpfspinne, weib.
Auf Hecken und Gebüsch hier nicht sehr selten.

Bild d.

Ufer - Hüpfspinne, Männ.
In hiesiger Gegend am Rande ausgetrockneter
Teiche, nicht sehr selten.

Bild e.

Schnelle Hüpfspinne, weib.
In Wäldern an alten Baumstämmen und an aufge-
klüftem Holze, hier, aber selten.

Die in dieser Lieferung gegebenen
Abbildungen, sind theils nach Exemplaren
meiner Sammlung, theils nach Originalzeichnungen
des verstorbenen Dr. Hahns gefertigt.

Die Fortsetzung wird bald folgen und so
interessant als möglich werden.
Ein kleiner Vorrath getrockneter Spinnem
den ich gegenwärtig nieder besitze, steht Lieb-
habern für möglichst billige Preise zu Diensten.
Briefe werden franco erbetten.

Auch meine übrigen naturhistorischen
Verlagswerke, werden so schön wie dieses
Spinnenwerk fortgesetzt, und ich empfehle
solche hiemit bestens.

Nürnberg, im August, 1836.

Joh. Jak. Lechner,
Naturalien- u. Kunsthändler.

Fig. a.

Salticus Pini, Fem. De Geor.
Germania, Suecia, etc. Prope Norimbergam in
fruticetis et arboris pinnis, frequens.

Fig. b.

Varietas praecedentis.

Fig. c.

Salticus flavipes, Fem. Hahn.
In dumetis et fruticetis, non raro.

Fig. d.

Salticus littoralis, Mas. Hahn.
In nostra regione ad ripas piscinarum et
uridarum, frequens.

Fig. e.

Salticus agilis, Fem. Hahn.
In sylvis in arborum truncis et in ligno, in hac
regione, infrequens.

Icones, quas hoc fasciculo tradidimus
partim secundum exemplaria thesauri mei
partim secundum picturas, quae Dr. Hahnium
defunctum ipsum auctorem habent, sunt depictae.




Continuatio mea secutura et quam maxime
excitatura est studium lectorum.

Parvus araneorum siccarum numerus, qui
mihi est in presenti, is, qui studio illarum te-
nentur, offertur emendus, quam optime minimo
pretio. — Epistolae ut rocturac pretio saluto mit-
tuntur, pretio.

Nec non reliqua historiae naturalis opera meis
impensis edita, non minus pulchre quam hoc
araneorum opus, continuatur, quae nunc op-
time commendata esse volo.


Norimbergae, mense Augusto, 1836.

Joan. Jac. Lechner,
artis operum et naturalium mercator.




Epeira

a. *sericca*, Oliv. b. *angulata*, Walk. Fem. c. *Schreibersii*, Hahn. Fem.








Theridion

a. b. *4-guttatum*. Hahn. Mar. et Fem. c. *anchorum*. Hahn. Fem. d. *4-signatum*. Hahn. Mar.
e. *sysiphum*. Walk. Fem.



Thomisus

a et b. *oblongus*, Müller, Mas. et Fem. c. *rhomboicus*, Walk. Fem. d. *diadema*, Hahn. Fem.
e. *robustus*, Hahn. Fem.



Salticus

a. *Pini*, De Geer. Fem. b. *Pini*, Variet. c. *flavipes*, Hahn. d. *agilis*, Hahn. Fem.
e. *littoralis*, Hahn. Mas.